



IRC : 2381142565311325
GTIN : 6260336200473
Batch No : Embossed
EXP : Embossed
Price : Embossed

ام دی فن®

کپسول

هر کپسول ام دی فن® حاوی مواد زیر است:
استامینوفن ۳۲۵ میلی گرم
ایبوپروفن ۲۰۰ میلی گرم
کافئین ۴۰ میلی گرم

موارد مصرف:

کپسول ام دی فن® برای برطرف کردن دردهای عضلانی، دردهای مفصلی، سردرد و سردردهای میگرنی استفاده می شود.

راهنمایی های عمومی:

- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری کنید.
- قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:
- ۱- سابقه حساسیت به این دارو و یا هر یک از ترکیبات آن.
- ۲- مصرف داروهایی مانند آ.اس.آ، متوترکسات، داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی، فوروزماید، مدرهای تیازیدی و سایر داروهای کاهش دهنده فشار خون.
- ۳- در صورت ابتلا به بیماری و یا اختلالات کلیوی، زخم معده/اثنی عشر، اختلالات در بینایی، سندرم پلیپ بینی و آتروادم.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

قبل از مصرف دارو، به پزشک یا دارو ساز خود اطلاع دهید.

هشدارها:

این دارو ممکن است در بعضی افراد سبب خواب آلودگی شود، لذا قبل از رانندگی و یا کار با ابزاری که نیاز به هوشیاری کامل دارد، از هوشیاری کامل خود مطمئن شوید.

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین میکند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر است:
بزرگسالان و افراد بالای ۱۲ سال: هر ۴ تا ۶ ساعت، ۱ کپسول و حداکثر ۶ کپسول در شبانه روز.

توجه:

- جهت کاهش تحریک دستگاه گوارش، دارو را همراه غذا و یا بلافاصله بعد از آن میل کنید.
- دارو را همراه با یک لیوان پر آب میل کنید.
- چنانچه یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید،

به محض یادآوری آن را مصرف کنید، اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است، از مصرف نوبت فراموش شده و یا دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری کنید.

عوارض جانبی:

بطور کلی تمام داروها به موازات اثرات درمانی، دارای برخی عوارض ناخواسته هستند، اگر چه کلیه این عوارض در یک فرد دیده نمیشود، لیکن در صورت بروز هر یک از آنها با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید. مهمترین این عوارض عبارتند از:

- سمیت کبدی
- گاستریت

مسمومیت با دوزهای بیش از اندازه:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده و بروز مسمومیت، فوراً با پزشک تماس گرفته و یا بیمار را به یک واحد درمانی برسانید.

شکل عرضه:

به صورت ۳ بلیستر ۱۰ عددی در یک جعبه.

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای پایین تر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از رطوبت و نور و در بسته بندی اصلی نگهداری کنید. از مصرف داروهای تاریخ گذشته جدا خودداری کنید.

ساخت شرکت داروسازی مرهم دارو تهران-ایران

واحد پاسخگویی به سوالات علمی
شرکت مرهم دارو

تلفن تماس ۰۹۱۲۲۵۰۳۰۷۰
Email: PMQC@marhamdaruco.ir



تلترنت مرهم دارو



تلترنت مرهم دارو



تلترنت مرهم دارو



تلترنت مرهم دارو



تلترنت مرهم دارو



Emdifen®

Capsules

Each Emdifen® capsule contains:

Acetaminophen	325 mg
Ibuprofen	200 mg
Caffeine	40 mg

Indication:

Emdifen® capsules are used to relief muscle pain, mild forms of arthritis, headache and other mild to moderate pains.

Before using this medicine:

In deciding to use a medicine, the risks of taking the medicine must be weighed against the good it will do. This is a decision you and your doctor will make. For this medicine the following should be considered:

- Tell your doctor if you have ever had any unusual or allergic reaction to this medicine or any other medicines, foods, dyes and preservatives.
- concomitant use of this medicine and ASA, methotrexate, furosemide, thiazide diuretics, blood pressure reducing drugs and non steroidal anti inflammatory drugs (NSAIDs).
- If you have kidney disturbances, stomach sore, vision disturbances, nose syndrome and angioedema.

Pregnancy and breast feeding:

It is not recommended using of this medicine during pregnancy and breast feeding. Don't take this medicine without first discussing with your doctor.

Dosing:

The dose of this medicine will be different for different patients. Follow your doctor's orders or the directions on the leaflet. In adult and 12 years of age and older patients the recommended dose is 1 capsule every 4-6 hours, not more than 6 capsules per 24 hours.

Missing dose:

If you miss a dose of this medicine, take it as soon as possible. However if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular dosing schedule. Do not double doses.

Overdosing:

In the case of accidental overdose, take the patient to health care and check with your doctors as soon as possible.

Side effects:

Along with its needed effects, a medicine may cause some unwanted effects.

Although not all of these side effects occur, if they do occur they may need medicine attention. Check with your doctor if any of the following side effects occur:

- Yellow eyes or skin that may be indicate hepatic disturbances.
- gastric disturbances such as diarrhea, loss of appetite, nausea and vomiting, stomach pain.

How supplied:

3 blisters of 10's in a folding box.

Storage:

Store below 30°C, protect from moisture and direct light.

Keep out of sight and reach of children.

Don't keep outdated medicine or medicine no longer needed.



Manufactured by Marham Daru Co.
Tehran-IRAN



MARHAM DARU CO.



MARHAM DARU CO.



MARHAM DARU CO.



MARHAM DARU CO.



MARHAM DARU CO.



MARHAM DARU CO.