



IRC : 4756531651054735
GTIN : 6260336200350
Batch No : Embossed
Mfg. Date : Embossed
Exp. Date : Embossed
Price : Embossed

اس دی اف[®]

سیلدنافیل

قرص روکشدار

دید غیر طبیعی (دوبینی، حساسیت به نور و دیدن رنگ‌ها و سایه‌ها متفاوت با قبل) سر درد، سرگیجه، گرگرفتگی، درد مثانه، ادرار کدر و خونی، افزایش مقدار ادرار و دفع دردناک ادرار، احتقان بینی، ناراحتی معده بعد از خوردن غذا، اسهال و بروز بثورات جلدی.

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از رطوبت، نور، گرما و درون جعبه نگهداری کنید.
از مصرف داروهای تاریخ گذشته جدا خودداری کنید.
دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

بسته بندی:

قرص خط دار و روکشدار ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرمی به صورت ۲ بلیستر ۴ عددی به همراه بروشور در یک جعبه.

ساخت شرکت داروسازی مرهم دارو تهران-ایران

واحد پاسخگویی به سوالات علمی
شرکت مرهم دارو

تلفن تماس ۰۹۱۲۲۵۰۳۰۷۰

Email: PMQC@marhamdaruco.ir



این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری فرمایید.

راهنمایی های عمومی:

- ۱- قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک مشورت نمایید:
 - در صورت هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگر و همچنین حساسیت به غذا، مواد محافظ و رنگ‌ها.
 - در صورت مصرف هر نوع داروی دیگر (چه با نسخه و چه بدون نسخه).
 - در صورت ابتلا به بیماری های قلبی، خونی، کبدی و کلیوی، دیابت و کلسترول بالا، نعوظ مداوم و غیرطبیعی، آلت تناسلی با شکل غیر طبیعی، التهاب رنگدانه های شبکیه و سن بالاتر از ۵۰ سال.
- ۲- دارو را طبق دستور پزشک مصرف کنید و دوره درمان را کامل کنید.
- ۳- در صورت نعوظ دردناک و طولانی مدت (۴ ساعت یا بیشتر) حتما به پزشک اطلاع دهید.
- ۴- این دارو را بطور همزمان با دیگر داروهایی که در درمان اختلال نعوظ استفاده می شود مصرف نکنید.
- ۵- چنانچه مصرف این دارو باعث کاهش دید یک یا هر دو چشم شد مفاصله دارو را قطع کرده و به پزشک خود اطلاع دهید. افراد مبتلا به بیماری های قلبی عروقی، فشار خون، دیابت، کلسترول بالا، اختلال بینایی، سیگاری ها و افراد بالاتر از سن ۵۰ سال در معرض کاهش ناگهانی بینایی هستند.

مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:

- ۱- تا ۶۵ سال: یک قرص SDF[®]50 به صورت تک دوزی یک بار در روز و یک ساعت قبل از فعالیت جنسی مصرف میشود.
- ۲- ۶۵ سال یا بیشتر: نصف قرص SDF[®]50 به صورت تک دوزی یک بار در روز و یک ساعت قبل از فعالیت جنسی مصرف میشود.
- ۳- اگر لازم باشد پزشک میتواند مقدار دوز روزانه را تا ۱۰۰ میلی گرم افزایش و یا تا ۲۵ میلی گرم کاهش دهد.

عوارض جانبی:

بطور کلی تمام داروها به موازات اثرات درمانی، دارای برخی عوارض ناخواسته هستند. اگرچه همیشه و تمام عوارض ذکر شده برای این دارو بروز نمیکند، لیکن در صورت بروز هر یک از آنها با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید:

SDF[®]

Sildenafil (As citrate)

F.C. Tablets

Category:

Impotence therapy agent

Indications:

Erectile dysfunction: SDF[®] is indicated to facilitate erections in men with erectile dysfunction.

Pharmacology/Pharmacokinetics:

SDF[®] (sildenafil citrate) is a selective inhibitor of phosphodiesterase type 5 (PDE5), an enzyme responsible for degrading cyclic guanosine monophosphate (cGMP) in the corpus cavernosum; Rapidly absorbed; absolute bioavailability is approximately 40%. A high-fat meal reduces absorption as shown by reducing the maximum plasma concentration (C max) by 29% and delaying time to peak concentration (T max) by 60 minutes; Protein binding 96%; Hepatic metabolism, via cytochrome P450 (CYP) 3A4 (major route) and CYP2C9 (minor route) with Half-life of about 4 hours; it has onset of action of about 0.5 hour after administration. Duration of action is up to 4 hours, but with less response than that seen at 2 hours.

Eliminate fecal (80% of the administered dose as metabolites); urinary (13% of the administered dose as metabolites).

Pregnancy & Breast-feeding:

FDA Pregnancy Category B; Problems in nursing mothers have not been documented.

Drug interactions and/or related problems:

Antihypertensive medications (such as amlodipine); Enzyme inhibitors, hepatic, cytochrome P450 (CYP) 3A4 including Cimetidine, Erythromycin, Itraconazole, Ketoconazole; Enzyme inducers, hepatic, cytochrome P450 (CYP) 3A4, including rifampin; Nitrates, including nitroglycerin (SDF[®] potentiates the hypotensive effect of nitrates; concomitant use is contraindicated).

Medical considerations/Contraindications:

Risk-benefit should be considered when the following medical problems exist

Abnormalities of the penis (such as: Anatomical deformity, Angulation of the penis, Cavernosal Peyronie's disease and fibrosis Hypospadias), Bleeding disorders (including peptic ulcer); Cardiac failure (Coronary artery disease causing unstable angina or Hypertension resulting in a blood pressure > 170/100 mm Hg or Hypotension resulting in a blood pressure < 90/50 mm Hg or Life-threatening arrhythmia, history of (within the previous 6 months) or Myocardial infarction, history of (within the previous 6 months) or Stroke, history of (within the previous 6 months).

Cirrhosis or Hepatic function impairment; Leukemia or Myeloma, multiple or Polycythemia or Priapism, history of or Sick cell disease or Thrombocytopenia; Renal function impairment; Retinitis pigmentosa; Sensitivity to SDF[®].

Side/Adverse Effects:

Those indicating need for medical attention

Incidence less frequent, 2 to 3% Abnormal vision, including blurred vision; color change perception or sensitivity to light; dizziness urinary tract infection or cystitis.

Incidence rare: Hematuria; ophthalmic effects, such as diplopia; increased intraocular pressure; paramacular edema; redness, burning or swelling of the eye; retinal vascular disease or bleeding; vision loss, temporary or vitreous detachment or traction: prolonged erection; priapism; Allergic reaction, anemia or asthenia; arthrosis; arthritis; gout or hyperuricemia; synovitis or tenosynovitis; tendon rupture, breast enlargement; cardiovascular effects, such as angina pectoris; AV block; cardiac arrest or sudden cardiac death; cerebral thrombosis; cerebrovascular hemorrhage; hypertension; hypotension, including orthostatic hypotension; migraine headache; myocardial ischemia, myocardial infarction or transient ischemic attack; palpitation; syncope; tachycardia; and ventricular arrhythmia; chills; deafness; edema; hyperglycemia; or hypoglycemia reaction; hypernatremia; myasthenia; ophthalmic effects, such as cataracts; conjunctivitis; dry eyes; eye hemorrhage; and mydriasis; shock; skin effects, such as contact dermatitis; pruritus or urticaria; exfoliative dermatitis; herpes simplex and skin ulcers.

Those indicating need for medical attention only if they continue or are bothersome

Incidence more frequent: Dyspepsia 7%; flushing 10%; headache 16%; nasal congestion 4%.

Incidence less frequent: Diarrhea.

Incidence rare: Anxiety.

Overdose:

Contact a poison control center.

Dosing:

Usual adult dose

Erectile dysfunction

Oral, 50 mg (base) one hour (range, one half to four hours) before sexual intercourse once a day if needed. As tolerated, subsequent doses may be increased to 100 mg or decreased to 25 mg once a day.

Usual adult prescribing limits

100 mg once a day.

Usual geriatric dose

Erectile dysfunction

Oral, 25 mg (base) one hour (range, one half to four hours) before sexual intercourse once a day if needed. As tolerated, subsequent doses may be increased.

How supplied:

50 and 100mg film coated scored tablets, two blisters of 4's in a folding box with a insert leaflet.

Storage:

Storage below 30 °C, protect from direct sunlight and moisture.



Manufactured by Marham Daru Co.
Tehran-Iran

