



IRC : 9684632059835799

GTIN : 6260336200466

Batch No : Embossed

EXP : Embossed

Price : Embossed

توژزیک® توژزیک® توژزیک® توژزیک® توژزیک® توژزیک® توژزیک®

دیگری را توصیه کند.

توژزیک®

قرص

هر قرص توژزیک® حاوی مواد زیر است:

استامینوفن ۵۰۰ میلی گرم
کافئین ۶۵ میلی گرم

راهنمایی های عمومی:

- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری کنید.
- قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:
 - ۱- وجود هر نوع حساسیت به دارو، مواد غذایی و رنگهای خوراکی.
 - ۲- نارسایی کلیوی.
 - ۳- نارسایی کبدی.
 - ۴- در صورت مصرف سایر داروهای حاوی استامینوفن یا کافئین.

هشدارها:

- در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده و یا مصرف طولانی مدت، احتمال ایجاد آسیب کبدی وجود دارد.
- از مصرف طولانی مدت و مداوم این دارو در بیماران مبتلا به نارسایی شدید کبدی و کلیوی خودداری کنید.
- در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده حتی بدون علائم به پزشک مراجعه کنید.

موارد مصرف:

در این فرآورده استامینوفن به عنوان مسکن و تب بر است و کافئین موجود در آن علاوه بر اثر محرکی خفیف روی سیستم اعصاب مرکزی باعث تقویت اثر تسکینی و تسریع بروز اثر استامینوفن می شود. این فرآورده برای برطرف کردن درد و تب ناشی از سردرد، میگرن، سرماخوردگی، آنفلوآنزا، گلودرد، گوش درد، دندان درد، کمر درد، دردهای روماتیسمی و عضلانی، نورالژی و دردهای قاعدگی مصرف می شود.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

گرچه با مصرف این دارو در زمان بارداری و یا شیردهی اثر سوئی روی جنین یا شیرخوار گزارش نشده، اما با این حال قبل از مصرف، موضوع را به پزشک و یا داروساز اطلاع دهید.

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار تجویز معمول این دارو به شرح زیر است:
بزرگسالان و افراد بالای ۱۲ سال: ۱-۲ قرص، ۴ بار در روز (حداکثر ۸ قرص) است، مگر پزشک مقدار

توجه:

- در صورتیکه تب شما با مصرف این دارو بعد از سه روز هنوز ادامه داشت و یا شدید تر شد حتما به پزشک مراجعه کنید.
- در مواردی که از این دارو بعنوان مسکن دردهای مفصلی استفاده می کنید، اگر بعد از ده روز، درد برطرف نشد به پزشک مراجعه کنید.

عوارض جانبی:

- به طور کلی تمام داروها به موازات اثرات درمانی، دارای برخی عوارض ناخواسته هستند، اگر چه کلیه این عوارض در یک فرد دیده نمیشود، لیکن در صورت بروز هر یک از آنها با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید. مهمترین این عوارض عبارتند از:
 - زردی چشم یا پوست
 - مدفوع سیاه یا خون آلود
 - تب همراه با لرز یا بدون لرز
 - درد در ناحیه کمر یا پهلو
 - لکه های ریز قرمز زیر پوستی
 - کاهش شنوایی

مسمومیت با دوزهای بیش از اندازه:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده و بروز مسمومیت، فوراً با پزشک تماس گرفته و یا بیمار را به یک واحد درمانی برسانید.

شکل عرضه:

به صورت ۳ بلیستر ۱۰ عددی در یک جعبه.

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای پایین تر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از رطوبت و نور و در بسته بندی اصلی نگهداری کنید. از مصرف داروهای تاریخ گذشته جدا خودداری کنید.

ساخت شرکت داروسازی مرهم دارو تهران-ایران

واحد پاسخگویی به سوالات علمی
شرکت مرهم دارو

تلفن تماس ۰۹۱۲۲۵۰۳۰۷۰

Email: PMQC@marhamdaruco.ir



شرکت مرهم دارو



شرکت مرهم دارو



شرکت مرهم دارو



شرکت مرهم دارو



شرکت مرهم دارو



Twogesic® Twogesic® Twogesic® Twogesic® Twogesic®

Twogesic®

Tablets

Each Twogesic® tablet contains:

Acetaminophen	500 mg
Caffeine	65 mg

Indication:

Twogesic® tablets are indicated for the relief of pain and fever from headache, migraine, common colds and flu, sore throat, toothache, backache, rheumatic and muscular pain, neuralgia and period pain.

Before using this medicine:

- Tell your doctor/pharmacist if you have ever had any unusual or allergic reaction to this medicine or any other medicines, foods, dyes and preservatives.
- In case of hepatic or kidney impairment.
- If you take any medicine containing Acetaminophen or Caffeine.

Pregnancy and breast feeding:

For Acetaminophen; it has not been reported to cause birth defects or other problems. Although it passes to the breast milk, however it has not been reported to cause problems in nursing babies.

For Caffeine; in doses less than 300mg/day (up to 4 Twogesic® tablets) it has not been reported to cause birth defects or other problems. Although it passes to breast milk in small amount, it has not been reported to cause any problem.

Dosing:

The dose of this medicine will be different for different patients. Follow your doctor's orders or the directions on the leaflet. In adult 12 years of age and older patients, the usual dose is 1-2 tablets four times a day, not exceed 8 tablets per 24 hours.

Overdosing:

In the case of accidental overdose, take the patient to health care center and check with your doctor as soon as possible.

Side effects:

Along with its needed effects, a medicine may cause some unwanted effects. Although not all of these side effects occur, if they do occur they may need medical attention. Check with your doctor if any of the following side effects occur:

- Yellow eyes or skin that may indicate hepatic disturbances may occur in overdose of Acetaminophen.

- However Caffeine can cause same side effects which are common with Caffeine/Caffeine containing drinks, but these effects may not occur with a such low doses and divided dosage regimen.

How supplied:

3 blisters of 10's in a folding box.

Storage:

Store below 30°C, protect from light and moisture. Keep out of reach and sight of children. Do not keep outdated medicine no longer needed.



Manufactured by Marham Daru Co.
Tehran-IRAN



MARHAM DARU CO.



MARHAM DARU CO.



MARHAM DARU CO.



MARHAM DARU CO.



MARHAM DARU CO.



MARHAM DARU CO.